



## PROFILAXIA PÓS EXPOSIÇÃO (PEP) PARA HIV

Do Ambulatório: \_\_\_\_\_

Para: \_\_\_\_\_ Idade: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### Uso interno:

- Lamivudina+Tenofovir** (TDF/3TC) 300mg/300mg ("2 em1") 01 cp ao dia por 28 dias
- Dolutegravir** (DTG) 50 MG 01 CP ao dia por 28 dias

Observações:

1. Não prescrever Omeprazol, pois inibe a absorção Do Atazanavir;
2. Ranitidina pode ser prescrita com intervalo de 12 horas em relação ao horário da PEP;
3. Hidróxido de alumínio: deve ser tomado 6 horas antes ou 2 horas depois da PEP;
4. Caso use Anticonvulsivante, entrar em contato com Infectologista do SAE para orientações;
5. Se diarreia: iniciar dieta obstipante;
6. Discreta icterícia pode ocorrer e não deve ser interrompido o tratamento, pois desaparecerá após o término da medicação.

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_



## PROFILAXIA PÓS EXPOSIÇÃO (PEP) PARA HIV

Do Ambulatório: \_\_\_\_\_

Para: \_\_\_\_\_ Idade: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### Uso interno:

- Lamivudina+Tenofovir** (TDF/3TC) 300mg/300mg ("2 em1") 01 cp ao dia por 28 dias
- Dolutegravir** (DTG) 50 MG 01 CP ao dia por 28 dias

Observações:

1. Não prescrever Omeprazol, pois inibe a absorção Do Atazanavir;
2. Ranitidina pode ser prescrita com intervalo de 12 horas em relação ao horário da PEP;
3. Hidróxido de alumínio: deve ser tomado 6 horas antes ou 2 horas depois da PEP;
4. Caso use Anticonvulsivante, entrar em contato com Infectologista do SAE para orientações;
5. Se diarreia: iniciar dieta obstipante;
6. Discreta icterícia pode ocorrer e não deve ser interrompido o tratamento, pois desaparecerá após o término da medicação.

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_



## PROFILAXIA PÓS EXPOSIÇÃO (PEP) PARA HIV

Do Ambulatório: \_\_\_\_\_

Para: \_\_\_\_\_ Idade: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### Uso interno:

- Lamivudina+Tenofovir** (TDF/3TC) 300mg/300mg ("2 em1") 01 cp ao dia por 28 dias
- Dolutegravir** (DTG) 50 MG 01 CP ao dia por 28 dias

Observações:

1. Não prescrever Omeprazol, pois inibe a absorção Do Atazanavir;
2. Ranitidina pode ser prescrita com intervalo de 12 horas em relação ao horário da PEP;
3. Hidróxido de alumínio: deve ser tomado 6 horas antes ou 2 horas depois da PEP;
4. Caso use Anticonvulsivante, entrar em contato com Infectologista do SAE para orientações;
5. Se diarreia: iniciar dieta obstipante;
6. Discreta icterícia pode ocorrer e não deve ser interrompido o tratamento, pois desaparecerá após o término da medicação.

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_



## Manual para Abordagem da exposição ocupacional a materiais biológicos 2017-2018

### Profilaxia pós-exposição (PEP) para HIV

<b>Tipo de Acidente</b>	<b>HIV (+)</b>	<b>HIV (-)</b>	<b>Paciente-fonte desconhecido *</b>
<b>Perfurocortante</b>	<b>PEP</b>	Não há indicação PEP	<b>PEP</b>
<b>Exposição Mucosa</b>	<b>PEP</b>	Não há indicação PEP	<b>PEP</b>

\*Quando o paciente-fonte recusar a coleta das sorologias OU quando se perder essa coleta por qualquer motivo, deve-se abordar o caso Como paciente-fonte desconhecido